

2

Volume 8 – Neuro<u>rradiologia</u>

MATHEUS DORIGATTI SOLDATELLI | DANIELLE SANTOS CÉSAR AUGUSTO PINHEIRO FERREIRA ALVES | LAZARO LUIS FARIA DO AMARAL

Malformações Congênitas Infratentorias

CBR RESPONDE

- 1) Qual conjunto de achados por imagens melhor caracterizam o fenótipo da malformação de Dandy Walker?
 - a) Hipoplasia predominantemente inferior do verme cerebelar, ângulo tegmentovermiano aumentado, deslocamento inferolateral da tela coroide/plexo coroide e recesso fastigial obtuso.
 - **b)** Hipoplasia predominantemente superior do verme cerebelar, ângulo tegmentovermiano aumentado, deslocamento inferolateral da tela coroide/plexo coroide e recesso fastigial obtuso.
 - c) Hipoplasia predominantemente inferior do verme cerebelar, ângulo tegmentovermiano reduzido, deslocamento inferolateral da tela coroide/plexo coroide e recesso fastigial obtuso.
 - **d)** Hipoplasia predominantemente superior do verme cerebelar, ângulo tegmentovermiano aumentado, deslocamento inferolateral da tela coroide/plexo coroide e recesso fastigial agudo.
 - **e)** Hipoplasia predominantemente inferior do verme cerebelar, ângulo tegmentovermiano aumentado, deslocamento inferolateral da tela coroide/plexo coroide e recesso fastigial agudo.
- 2) Qual alternativa abaixo descreve os achados mais característicos da Malformação de Chiari do tipo 2?
 - a) Herniação inferior das tonsilas e verme cerebelar, teto mesencefálico "em bico", disrafismo espinal fechado, fossa posterior pequena e inserção baixa da torcula e do seio transverso.
 - **b)** Herniação inferior das tonsilas e verme cerebelar, teto mesencefálico "em bico", disrafismo espinal aberto, fossa posterior pequena e inserção baixa da torcula e do seio transverso.
 - c) Herniação inferior das tonsilas e verme cerebelar, teto mesencefálico "em bico", disrafismo espinal aberto, fossa posterior alargada e inserção alta da torcula e do seio transverso.
 - **d)** Herniação inferior das tonsilas e verme cerebelar, teto mesencefálico "em bico", colpocefalia, estenogiria e inserção alta da torcula e do seio transverso.
 - **e)** Herniação inferior das tonsilas e verme cerebelar, teto mesencefálico "em bico", colpocefalia, estenogiria e ossos petrosos convexos com clivo alongado.

Respostas

1) Alternativa: A

2) Alternativa: B