

# Síndromes Demenciais

**Tabela 12.1 – Critérios NINDS-AIREN.****Topografia****Grandes vasos**

1. ACA: apenas infartos bilaterais são suficientes para atender aos critérios do NINDS-AIREN.
2. PCA: apenas se:
  - a. Infartos talâmicos paramedianos.
  - b. Lobo temporal medial inferior.
3. Áreas de associação: MCA
  - a. Parietotemporal.
  - b. Temporo-occipital.
4. Zonas fronteiriças (“Watershed”), acometendo as regiões:
  - a. Frontal superior.
  - b. Parietal.

**Pequenos vasos**

1. Isquemia decorrente de oclusão de vasos perforantes pode se manifestar como lacunas isquêmicas ou lesões de substância branca.
  - a. Múltiplas lacunas de substância branca em núcleos da base e frontal: ao menos 2 lacunas na região dos núcleos da base (incluindo tálamo e cápsula interna) e ao menos 2 lacunas na substância branca frontal.
  - b. Extensas lesões de substância branca: confluentes, Fazekas 3, envolvendo lobos frontal e parietal bilateral.
  - c. Lesões talâmicas bilaterais: ao menos 1 lacuna em cada tálamo.

**Gravidade**

1. Doença de grandes vasos do hemisfério dominante.
2. Acidentes vasculares cerebrais hemisféricos bilaterais de grandes vasos.
3. Lesões da substância branca envolvendo pelo menos 1/4 da substância branca total.