

# Endometriose

## Ultrassonografia com preparo intestinal e Doppler colorido para pesquisa de Endometriose

**D.U.M:** \_\_

### Indicação clínica

#### Compartimento anterior

- Bexiga de aspecto normal.
- Espaço vesicouterino e ligamentos redondos sem alterações ecográficas.

#### Compartimento médio

- Útero em \_\_\_\_ flexão, medindo 0 x 0 x 0 cm, com volume de 0 cm<sup>3</sup> (normal até 90 cm<sup>3</sup>). Apresenta contornos regulares e textura miometrial característica.
- Adeniose: não / sim, **focal / difusa** na parede \_\_\_\_ (**menor/maior** que 50% da espessura miometrial).
- Apresenta contornos lobulados e textura miometrial heterogênea à custa de nódulos compatíveis com miomas, assim distribuídos:

	Localização	Medidas	Manto interno	Manto externo	Classificação
1		0 x 0 cm	0 cm	0 cm	
2					

- Endométrio centrado, com espessura de \_\_\_\_ cm, com padrão \_\_\_\_ (proliferativo / trilaminar / secretor).
- Ovário direito em localização habitual, móvel, medindo 0 x 0 x 0 cm, com volume de 0 cm<sup>3</sup> (normal até 10 cm<sup>3</sup>), conservando textura característica e contornos normais. Apresenta cerca de x folículos. **Não se observam cistos de conteúdo espesso.**
- Endometrioma: não / sim

Endometrioma	Localização	Tipo	Medidas
1	central / periférico	típico / atípico	0 x 0 cm
2	central / periférico	típico / atípico	0 x 0 cm

- Fossa ovárica direita sem alterações evidentes.
- Ovário esquerdo em localização habitual, móvel, medindo 0 x 0 x 0 cm, com volume de 0 cm<sup>3</sup> (normal até 10 cm<sup>3</sup>), conservando textura característica e contornos normais. Apresenta cerca de x folículos. **Não se observam cistos de conteúdo espesso.**

# Endometriose

- Endometrioma: não / sim

Endometrioma	Localização	Tipo	Medidas
1	central / periférico	típico / atípico	0 x 0 cm
2	central / periférico	típico / atípico	0 x 0 cm

- Fossa ovárica esquerda sem alterações evidentes.
- Tubas uterinas sem alterações ecográficas.
- Doppler colorido e espectral das artérias uterinas e ovarianas sem anormalidades.

## Compartimento posterior

- Região retrocervical sem alterações ecográficas.
- Fórnices vaginais livres.
- Espaço retovaginal e septo retovaginal sem particularidades ao método.
- Retossigmoide sem alterações ecográficas evidentes.

Lesões	Distância BA	Medidas	Camadas	Circunferência
1	0 cm	0 x 0 x 0 cm	MPE / MPI / SM	0%

BA: borda anal, MPE: muscular própria externa, MPI: muscular própria interna, SM: submucosa

- Pequena quantidade de líquido livre na cavidade pélvica.

## Compartimento lateral

- Paramétrios sem alterações ecográficas.
- Paredes pélvicas sem alterações ecográficas
- Ureteres com calibres preservados e fluxos presentes ao Doppler colorido.

## Sítios extra-pélvicos

- Região subdiafragmática direita sem alterações ecográficas evidentes.
- Cólon descendente e região ileocecopendicular sem alterações ecográficas evidentes.
- Parede abdominal e regiões inguinais de aspecto ecográfico preservado.

## Opinião

- Aspecto ecográfico dos órgãos examinados dentro da normalidade.