

## Patologias Ovarianas Benignas e Malignas – IOTA e o-RADS

<b>Consenso sobre o achado incidental de cistos simples na ultrassonografia</b>		
<b>Atualização da Sociedade de Radiologistas em Ultrassonografia (SRU) – 2019</b>		
Status hormonal	Pré-menopausa	Pós-menopausa
Ovários normais	Cistos simples $\leq 3$ cm são funcionais e não devem ser relatados como cistos	Cistos simples $\leq 1$ cm não devem ser relatados como cistos
Achados benignos/sem follow-up	Cistos simples $> 3$ cm e $\leq 5$ cm são achados benignos.	Cistos simples $> 1$ cm e $\leq 3$ cm são achados benignos.
Cisto simples benigno/ follow-up frequente	5 cm a $\leq 7$ cm : 2 a 6 meses para avaliação de caracterização e 6 a 12 meses para avaliação de crescimento	3 cm a $\leq 5$ cm: 3 a 6 meses para avaliação de caracterização e 6 a 12 meses para avaliação de crescimento
Cisto simples benigno/ follow-up necessário	$> 7$ cm: 2 a 6 meses para avaliação de caracterização e 6 a 12 meses para avaliação de crescimento	$> 5$ cm: 3 a 6 meses para avaliação de caracterização e 6 a 12 meses para avaliação de crescimento

Fonte: Adaptada de Mansour S, Hamed S, Kamal R. Spectrum of ovarian incidentalomas: diagnosis and management. Br J Radiol. 2023;96(1142):20211325.