

Ultrassonografia Morfológica no Primeiro Trimestre: Marcadores Ultrassonográficos e Predição de Pré-Eclâmpsia

Quadro 1 – Critérios de Risco para Pré-Eclâmpsia segundo diferentes entidades.

| Entidade | Fatores de Risco | Classificação |
|----------|--|---|
| NICE | <p>Alto Risco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Doença Hipertensiva em gestação anterior ■ Doença Renal Crônica ■ Doença Autoimune, como LES ou SAAF ■ Diabetes <i>Mellitus</i> Tipo 1 ou 2 ■ Hipertensão Arterial Sistêmica (Crônica) <p>Risco Intermediário:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Primeira Gestação ■ Idade: 40 anos ou mais ■ Intervalo intergestacional maior que 10 anos ■ IMC ≥ 35 kg/m² na primeira consulta ■ História familiar de pré-eclâmpsia ■ Gestação múltipla | <p>São consideradas alto risco as mulheres que apresentam:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 fator de alto risco ou ■ 2 ou mais fatores de risco intermediário |
| ACOG | <p>Alto Risco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ História pessoa de pré-eclâmpsia (especialmente se acompanhada de desfecho adverso) ■ Gestação Múltipla ■ Hipertensão Arterial Sistêmica (Crônica) ■ Diabetes <i>Mellitus</i> Tipo 1 ou 2 ■ Doença Renal ■ Doença Autoimune (por exemplo, LES e SAAF) <p>Risco Moderado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nuliparidade ■ Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²) ■ História Familiar de pré-eclâmpsia (mãe ou irmã) ■ Características Sociodemográficas (raça afro-americana, baixo nível socioeconômico) ■ Idade: 35 anos ou mais ■ Fatores de Risco individuais: baixo peso ao nascer ou pequeno para idade gestacional, desfecho gestacional adverso prévio, intervalo intergestacional maior que 10 anos | <p>São consideradas alto risco as mulheres que apresentam:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 fator de alto risco ou ■ 2 ou mais fatores de risco moderado |
| FEBRASGO | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hipertensão Arterial Sistêmica (Crônica)* ■ Idade > 40 anos ■ IMC > 30 na primeira consulta de pré-natal* ■ História Familiar de pré-eclâmpsia (avó, mãe, irmã) * ■ História Pessoal de pré-eclâmpsia* ■ Nuliparidade ■ Gestação Múltipla* ■ Diabetes <i>Mellitus</i> pré-existente* ■ SAAF e Outras Doenças autoimunes* ■ Doenças Renais* | <p>Qualquer um dos fatores presente indica o uso de métodos para prevenção da pré-eclâmpsia, com maior valor, contudo, aos marcados com asterisco</p> |

ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; FEBRASGO: Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia; LES: Lúpus Eritematoso Sistêmico; SAAF: Síndrome dos Anticorpos Antifosfolípide; IMC: Índice de Massa Corpórea (= Peso[kg]/Estatura[m]²).