

PRINCIPAIS SUBTIPOS TUMORAIS DO CÂNCER DE MAMA

| Subtipo | Status do receptor hormonal / Grau histológico | Prognóstico |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUMINAL A | Receptor hormonal alto (ER e PR positivos); Baixa taxa de proliferação celular (baixo Ki-67, baixa contagem mitótica); Geralmente HER2 negativo; Geralmente grau histológico 1 ou 2. | Prognóstico favorável, taxa de sobrevivência em 5 anos > 80%; Boa resposta a terapias endócrinas. |
| LUMINAL B | Receptor hormonal baixo (menor expressão de ER e PR); Alta taxa de proliferação celular (alto Ki-67, alta contagem mitótica); Geralmente HER2 negativo, mas aproximadamente 30% dos casos serão HER2 positivos; Geralmente grau histológico 3. | Prognóstico menos favorável em comparação com luminal A; Menos responsivo a terapias endócrinas. |
| HER 2 POSITIVO | HER2 positivo (ER e PR negativo ou positivo); Geralmente grau histológico 3. | A terapia direcionada para cânceres HER2 positivos melhorou o prognóstico. |
| BASAL | Mais comumente triplo negativo (ER, PR e HER2 negativos); Super expressão de oncogenes que favorecem a proliferação celular e a carcinogênese; Geralmente grau histológico 3. | Prognóstico desfavorável. |