

# Espaço Cervical Infra-Hioideo

## CBR Responde

- 1) Dentre os espaços cervicais abaixo, marque aquele que é exclusivamente infra-hioideo.
  - b) Espaço visceral.
  - c) Espaço mastigatório.
  - d) Espaço cervical posterior
  - e) Espaço de perigo.
  - f) Espaço retrofaríngeo.
  
- 2) Marque a alternativa correta.
  - a) O espaço carotídeo contém somente a artéria carótida interna.
  - b) A tireoide se localiza em um espaço cervical supra-hioideo.
  - c) O nervo vago não tem seu trajeto pelo pescoço infra-hioideo.
  - d) As glândulas paratireoides se localizam no espaço cervical visceral.
  - e) As fáscias cervicais não possuem a função de barreiras naturais contra infecções, servindo, somente, para divisão dos compartimentos do pescoço.
  
- 3) Assinale a alternativa incorreta acerca das massas cervicais.
  - a) A ressonância magnética do pescoço é, por vezes, necessária para auxílio na investigação etiológica.
  - b) O uso de contraste iodado endovenoso na tomografia de pescoço é dispensável na maioria dos casos.
  - c) Quando a massa se encontra no espaço cervical posterior, uma das hipóteses diagnósticas pode ser linfonodomegalia.
  - d) Na tomografia computadorizada de pescoço, se a massa está centrada no espaço visceral e desloca anteriormente a glândula tireoide, apresentando realce na fase arterial, uma das principais hipóteses diagnósticas é de aumento da glândula paratireoide.
  - e) O nervo vago possui trajeto pelo espaço carotídeo, tanto supra quanto infra-hioideo.
  
- 4) No caso de aparecimento do carcinoma de células escamosas no esôfago cervical, qual será o primeiro espaço atingido?
  - a) Espaço mastigatório.
  - b) Espaço cervical posterior.
  - c) Espaço de perigo.
  - d) Espaço visceral.
  - e) Espaço perivertebral.

## Espaço Cervical Infra-Hioideo

- 5) Sobre espaços cervicais, marque a alternativa correta:
- a) O espaço visceral contém esôfago, traqueia, glândula tireoide, glândulas paratireoides, laringe e hipofaringe.
  - b) O espaço perivertebral não compreende os corpos das vértebras cervicais.
  - c) Infecções no espaço de perigo nunca se estendem para o mediastino, uma vez que a fáscia cervical profunda impede essa propagação.
  - d) O espaço carotídeo contém a porção superior do arco aórtico, que se projeta além do mediastino.
  - e) Todos os espaços cervicais infra-hioideos possuem uma porção supra-hioidea.
- 6) Assinale a alternativa correta:
- a) A avaliação normal das glândulas paratireoides por ultrassonografia é corriqueira e não exige grande experiência do examinador.
  - b) O divertículo de Zenker localiza-se no espaço cervical supra-hioideo.
  - c) O espaço de perigo é restrito ao espaço cervical, assim como o espaço retrofaríngeo.
  - d) As fáscias cervicais superficial e profunda servem para a divisão dos espaços cervicais tanto supra quanto infra-hioideos.
  - e) Infecções dos espaços cervicais facilmente se propagam para os outros espaços.
- 7) Sobre as fáscias cervicais, marque a alternativa correta:
- a) A fáscia cervical superficial se subdivide em três camadas: superficial, média e profunda.
  - b) A camada superficial da fáscia cervical profunda envolve as glândulas submandibular e parótida e os músculos esternocleidomastoideo e trapézio.
  - c) A camada média da fáscia cervical profunda frequentemente envolve a coluna vertebral e os músculos perivertebrais.
  - d) A camada profunda da fáscia cervical profunda envolve os músculos perivertebrais anteriores, ao passo que a coluna vertebral é sustentada pela musculatura perivertebral posterior.
  - e) A falha na continuidade das fáscias cervicais não possui relação com a velocidade na propagação de infecções.

### Respostas

- 1) Alternativa: A
- 2) Alternativa: D
- 3) Alternativa: B
- 4) Alternativa: D
- 5) Alternativa: A
- 6) Alternativa: D
- 7) Alternativa: B