

Glândula Tireoide: Avaliação por Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética

CBR Responde

- 1) Para avaliação de bócio mergulhante, qual o posicionamento correto do paciente na mesa de TC ou RM?
- 2) Como deve ser idealmente o protocolo de TC nos casos de investigação de carcinoma papilífero da tireoide?
- 3) Quais os principais achados de imagem que predizem a invasão do nervo laríngeo recorrente?
- 4) Quais os principais critérios de irrisecabilidade cirúrgica do câncer de tireoide (relacionados ao fator T)?
- 5) Quais os principais sítios de metástases do câncer de tireoide?

Respostas

- 1) O paciente deve ser colocado em decúbito dorsal com os dois membros superiores justapostos ao tronco e o pescoço em hiperextensão (reproduzindo o mesmo posicionamento cirúrgico).
- 2) O exame deve ser realizado sem e com contraste (em fase arterial), desde a base do crânio até a carina.
- 3) Além dos sinais de paralisia da prega vocal (nem sempre presentes), a obliteração da gordura do sulco traqueoesofágico pelo tumor e um contato superior a 25% da circunferência deste com a cápsula posterior da tireoide predizem envolvimento do nervo laríngeo recorrente.
- 4) Encarceramento da artéria carótida comum e invasão do espaço pré-vertebral.
- 5) Pulmões e ossos.