

## Estômago e Duodeno

### CBR RESPONDE

- 1) Em relação às atresias do trato digestivo, é incorreto afirmar:
  - a) O sinal da “única bolha” pode ser visto no RX de atresia do piloro
  - b) O sinal de “dupla bolha” sugere atresia duodenal
  - c) A atresia duodenal é a mais frequente
  - d) A atresia duodenal frequentemente associa-se a outras malformações
  - e) Na ultrassonografia obstétrica, o polidrômio é observado somente na atresia duodenal
  
- 2) Sobre o GIST, é incorreto afirmar:
  - a) Localização mais frequente é o estômago
  - b) Podem ser exofíticos, endoluminais ou intramurais
  - c) A segunda localização mais comum é o intestino delgado
  - d) A maioria expressa o receptor de membrana KIT (CD117), usado na terapia alvo com imatinib
  - e) A resposta ao tratamento pode ser feito por critérios RECIST
  
- 3) Sobre as cirurgias bariátricas, é correto afirmar:
  - a) A síndrome do esvaziamento gástrico acelerado (“dumping”) pode ocorrer tanto na gastrectomia vertical como no *bypass* gástrico.
  - b) O “bypass” gástrico não é considerado um procedimento disabsortivo e restritivo.
  - c) Se houver suspeita de fístula no PO imediato de cirurgia bariátrica, sugere-se RX EED com bário para avaliar a anastomose.
  - d) A diferença do “duodenal switch” com o “bypass” gástrico é que a derivação biliopancreática com desvio duodenal é um procedimento que mantém o estômago maior e encurta mais o intestino delgado, ocorrendo menos restrição e mais disabsorção dos nutrientes.
  - e) A fístula gastrogástrica pós “sleeve” não é causa de re-ganho de peso.
  
- 4) Sobre os volvos gástricos, é incorreto afirmar:
  - a) São dois subtipos principais: o volvo organoaxial e o volvo mesenteroaxial
  - b) O volvo organoaxial é muito mais comum que o volvo mesenteroaxial
  - c) No volvo organoaxial o estômago gira em torno da linha cardiopilórica
  - d) No volvo mesenteroaxial a torção ocorre ao longo do eixo axial, perpendicular ao eixo longitudinal
  - e) Geralmente o volvo organoaxial é mais grave
  
- 5) Sobre os tumores gástricos, é incorreto:
  - a) Tumores neuroendócrinos não são os mais frequentes
  - b) É sítio comum de metástases
  - c) Pode ser difícil a diferenciação do linfoma gástrico difuso e o adenocarcinoma associado à linite plástica
  - d) O adenocarcinoma gástrico pode ser dividido, pela classificação de Lauren, em intestinal e difuso
  - e) O câncer gástrico é classificado como precoce (limitado à mucosa ou submucosa) e avançado (ultrapassa a muscular própria)