

Tumores Primários de Retroperitônio

Tabela 1			
Tecido de origem/distribuição nos exames de imagem	Diagnósticos diferenciais	Achados típicos	Tratamento
Gordura	Lipossarcoma	<ul style="list-style-type: none"> > 10 cm Heterogênea, com grande quantidade de gordura macroscópica 	Cirurgia ± RT neoadjuvante
	Lipoma	<ul style="list-style-type: none"> Margens bem definidas Pequenas dimensões Atenuação homogênea de gordura 	Cirurgia
	Teratoma maduro	<ul style="list-style-type: none"> Predominantemente císticos Áreas de gordura macroscópica Calcificações Nível líquido-gordura 	Cirurgia
	Hematopoiese extramedular	<ul style="list-style-type: none"> Múltiplas massas Homogêneas Bilaterais Áreas de gordura macroscópica 	Tratar a doença de base
Estroma mixoide	Neurofibroma	<ul style="list-style-type: none"> Massa sólida Redondo/fusiforme Homogêneo Hipoatenuante Podem ser visualizadas áreas císticas 	Cirurgia ± RT adjuvante
	Schwannoma	<ul style="list-style-type: none"> Massa sólida Oval/esférica Realce homogêneo / heterogêneo 	Cirurgia
	Ganglioneuroma	<ul style="list-style-type: none"> Massa bem definida Hipodensa 	Cirurgia
Necrose	Leiomiossarcoma	<ul style="list-style-type: none"> Volumosa massa heterogênea Isoatenuante em relação ao músculo Infiltrativa Área necrótica central Realce heterogêneo 	Cirurgia
	Paraganglioma	<ul style="list-style-type: none"> Massa paraaórtica Bem delimitada Heterogênea Área necrótica central Hemorragia Calcificações 	Cirurgia
Áreas císticas	Linfangioma cístico	<ul style="list-style-type: none"> Massa cística Uni/multilocular Paredes/septos finos Conteúdo variável 	Cirurgia
Padrão em manto	Doença de Erdheim-Chester	<ul style="list-style-type: none"> Tecido simétrico e bilateral Atenuação de partes moles ao redor da aorta, rins e espaço perirrenal Homogêneo 	Terapia direcionada para a mutação existente
	Fibrose retroperitoneal	<ul style="list-style-type: none"> Tecido de partes moles homogêneo Mal definido e irregular Frequentemente ao redor da aorta abdominal e artérias ilíacas comuns proximais 	Glicocorticoide/ imunossupressores
	Linfoma	<ul style="list-style-type: none"> Massa bem definida Homogênea Hipovascular Localização paraaórtica ou pélvica 	QT ± RT ou imunoterapia