

Neoplasias de Cabeça e Pescoço

Tabela 4.6 – Estadiamento de tumor primário de Seio Maxilar, Cavidade Nasal/Seio Etmoidal 8ª ed. AJCC

Categoria	Critério T Seio Maxilar	Critério T Cavidade Nasal /Seio Etmoidal
Tx	Tumor primário não pode ser acessado	Tumor primário não pode ser acessado
Tis	Carcinoma <i>in situ</i>	Carcinoma <i>in situ</i>
T1	Tumor limitado à mucosa do seio maxilar sem erosão ou destruição óssea.	Tumor restrito a qualquer subsítio, com ou sem invasão óssea
T2	Tumor causando erosão ou destruição óssea, incluindo extensão para o palato duro e/ou meato nasal médio, exceto extensão para a parede posterior do seio maxilar e placas pterigoides.	Tumor invadindo dois subsítios em uma única região ou estendendo-se para envolver uma região adjacente dentro do complexo nasoetmoidal, com ou sem invasão óssea
T3	Tumor invade qualquer um dos seguintes: osso da parede posterior do seio maxilar, tecidos subcutâneos, assoalho ou parede medial da órbita, fossa pterigoide, seios etmoidais.	Tumor se estende para invadir a parede medial ou o assoalho da órbita, seio maxilar, palato ou placa cribiforme
T4a	Doença local moderadamente avançada. Tumor invade conteúdo orbitário anterior, pele da bochecha, placas pterigoides, fossa infratemporal, placa cribiforme, seios esfenoidal ou frontal.	Doença local moderadamente avançada. Tumor invade qualquer um dos seguintes: conteúdo orbitário anterior, pele do nariz ou bochecha, extensão mínima para fossa craniana anterior, placas pterigoides, seios esfenoidal ou frontal.
T4b	Doença local muito avançada. Tumor invade qualquer um dos seguintes: ápice orbital, dura-máter, cérebro, fossa craniana média.	Doença local muito avançada. Tumor invade qualquer um dos seguintes: ápice orbital, dura-máter, cérebro, fossa craniana média, nervos cranianos diferentes de (V2).

Fonte: Desenvolvido pela autoria, baseado na 8ª edição da AJCC American Joint Commission in Cancer Staging Manual, 2016 update december 2020.