



## Neoplasias Peritoneais e Retroperitoneais

### Índice de Carcinomatose Peritoneal (ICP)



Regiões	Score
0. Central	
1. Superior direito	
2. Epigástrico	
3. Superior esquerdo	
4. Flanco esquerdo	
5. Inferior esquerdo	
6. Pelve	
7. Inferior direito	
8. Flanco direito	
9. Jejunio superior	
10. Jejunio inferior	
11. Íleo superior	
12. Íleo inferior	
<b>ICP=</b>	<b>0/39</b>

Score do tamanho da lesão
LS0 sem tumor visível
LS1 Tumor ≤ 0,5 cm
LS2 Tumor ≤ 5 cm
LS3 Tumor > 5 cm ou confluyente

O Índice de Carcinomatose Peritoneal (ICP) é uma escala cirúrgica criada para avaliação do volume e da extensão da doença peritoneal, posteriormente adaptada para exames de imagem. O abdome é dividido em treze sítios de avaliação - o abdome e a pelve são divididos em nove sítios e as alças intestinais delgadas (jejuno e íleo) em outros quatro sítios. A dimensão do depósito tumoral é avaliada individualmente em cada sítio, com um com um escore que varia de 0 a 3. O escore total é calculado a partir da soma dos escores de cada região, variando de 0 a 39.

Visto que os exames de imagem tendem a subestimar a extensão da doença peritoneal, o papel do radiologista é de fornecer uma avaliação global da carga tumoral, especialmente de locais de envolvimento que podem dificultar ou impedir uma citorredução completa, auxiliando assim na melhor abordagem terapêutica.