

Lesões Cutâneas

CBR Responde

- 1) Qual o sinal ultrassonográfico que quando presente é característico do cisto de inclusão epidérmico?
 - a) Reforço acústico posterior.
 - b) Bandas hipoecóicas, correspondentes a cristais de colesterol.
 - c) Punctum.
 - d) Imagens hiperecóicas lineares dispostas em camadas.

- 2) Qual a maior complicação da necrose do subcutâneo do recém-nascido?
 - a) Hipercalcemia.
 - b) Esclerema.
 - c) Infecção.
 - d) Embolia gordurosa.

- 3) Com relação aos lipomas na criança, é correto afirmar:
 - a) São tumores benignos frequentes nas crianças compostos por células maduras.
 - b) Os diferentes tipos de tumores gordurosos são facilmente diferenciados pelos métodos de imagem, pois suas composições e comportamentos são distintos.
 - c) O angiomiolipomas são menos ecogênicos que a gordura subcutânea adjacente e são mais infiltrativos.
 - d) O lipoblastoma acomete crianças abaixo de 3 anos, tende a ser encapsulado e subcutâneo.

- 4) Com relação ao hemangioma infantil é correto afirmar, exceto:
 - a) É a causa mais comum de nódulos nas crianças abaixo de um ano de vida.
 - b) A criança já apresenta a lesão ao nascimento.
 - c) Cresce rapidamente nas primeiras semanas de vida, tem um período de estabilidade e por volta dos 12-18 meses começa a involuir lentamente.
 - d) Podem estar associados a síndrome PHACE e LOMBAR.

Lesões Cutâneas

- 5) Com relação ao pilomatricoma é correto afirmar, exceto:
- a) É um tumor benigno da matriz pilosa.
 - b) Frequentemente apresenta calcificação.
 - c) Existem várias formas de apresentação.
 - d) A identificação de vascularização no interior da lesão deve ser suspeita para transformação maligna.

Respostas

- 1) Alternativa: C
- 2) Alternativa: A
- 3) Alternativa: D
- 4) Alternativa: B
- 5) Alternativa: D