

## Aparelho Urinário

### CBR Responde

- 1) A respeito das nefropatias parenquimatosas difusas, é INCORRETO afirmar que:
  - a) A diabetes é uma das causas mais comuns.
  - b) A hipertensão arterial é um dos fatores que pode levar a essa condição.
  - c) Estão sempre associadas a uma diminuição da espessura do parênquima.
  - d) Os rins podem manter dimensões normais ou aumentadas na nefropatia diabética, mesmo em estágios terminais.
  
- 2) respeito dos nódulos hiperecogênicos renais, é INCORRETO afirmar que:
  - a) São achados sempre benignos e não devem causar preocupações.
  - b) Normalmente correspondem à angiomiolipomas.
  - c) Carcinoma de células renais podem ser hiperecogênicos e simular angiomiolipomas
  - d) Quando múltiplos podem estar associados à esclerose túberosa.
  
- 3) Quanto à nefrocalcinose medular é INCORRETO afirmar:
  - a) É um achado frequente em exames de rotina de pacientes assintomáticos
  - b) Hiperparatireoidismo, excesso de vitamina D e acidose tubular distal são causas frequentes.
  - c) A tomografia é o método mais sensível para a sua identificação.
  - d) Os achados podem ser permanentes mesmo com a tratamento da causa.
  
- 4) A respeito dos cistos renais é INCORRETO afirmar
  - a) É um achado frequente em exames de rotina de pacientes assintomáticos.
  - b) são incomuns em crianças, e quando presentes podem ser manifestação inicial de ADPKD.
  - c) Carcinoma de células renais podem ser císticos.
  - d) nda

## Aparelho Urinário

- 5) A respeito das doenças policísticas é incorreto afirmar
- a) A forma do adulto é frequente, acometendo aproximadamente 1 a cada 1000 pessoas, correspondendo à terceira causa de diálise no nosso meio.
  - b) A forma infantil pode estar associada à doença de Caroli e também à fibrose hepática .
  - c) A forma infantil tem transmissão autossômica dominante.
  - d) nda

### Respostas

- 1) Alternativa: C
- 2) Alternativa: A
- 3) Alternativa: C
- 4) Alternativa: D
- 5) Alternativa: C