

Trato Gastrointestinal

CBR Responde

- 1) No exame ultrassonográfico com transdutor linear, analisando a parede do tubo digestivo de dentro da luz visceral para fora, são identificadas (indique a alternativa correta):
 - a) 1ª camada: ecogênica - interface do conteúdo visceral com a superfície mucosa (incluindo a mucosa superficial).
 - b) 2ª camada: hiperecogênica - mucosa superficial (incluindo a muscularis mucosae).
 - c) 3ª camada: hipoecogênica - submucosa.
 - d) 4ª camada: hiperecogênica - muscular profunda.
 - e) 5ª camada: hipoecogênica - serosa

- 2) O apêndice normal apresenta as seguintes características à ultrassonografia:
 - a) diâmetro antero posterior máximo de 8 mm
 - b) facilmente compressível
 - c) camadas parietais não definidas
 - d) fluxo parietal exuberante ao Doppler
 - e) não é possível identificar o apêndice normal ao ultrassom

- 3) Assinale a alternativa que apresenta as principais características ultrassonográficas no diagnóstico da doença de Crohn em atividade:
 - a) Espessamento da parede intestinal com predomínio da camada muscular, gordura mesentérica adjacente hipoecogênica, hiperemia, linfonodomegalias mesentéricas.
 - b) Espessamento da parede intestinal, presença de encurtamento intestinal, hipovascularização parietal, linfonodomegalias mesentéricas.
 - c) Redução da espessura da parede intestinal, presença de estreitamentos no lúmen intestinal, hiperemia, linfonodomegalias mesentéricas
 - d) Espessamento da parede intestinal com predomínio da camada submucosa, aumento da ecogenicidade da gordura mesentérica adjacente, hiperemia, linfonodomegalias mesentéricas
 - e) Espessamento da parede intestinal com predomínio da camada serosa, presença de estreitamentos no lúmen intestinal, gordura mesentérica adjacente hipoecogênica, hiperemia, linfonodomegalias mesentéricas.

Trato Gastrointestinal

- 4) Com relação ao estudo ecográfico das vísceras ocas, podemos afirmar, exceto:
- a) é o método de escolha no diagnóstico das invaginações e estenose hipertrófica do piloro
 - b) o espessamento parietal é sinal importante nos processos inflamatórios
 - c) a não visualização do apêndice espessado afasta a possibilidade de apendicite aguda
 - d) as diverticulites em fase avançada podem apresentar coleção peri-cólica caracterizando a perfuração do divertículo
 - e) o diagnóstico da adenite mesentérica é de exclusão, pois a presença de linfonodos aumentados pode ser reacional a processos inflamatórios de outros sítios
- 5) Os principais achados ecográficos da diverticulite aguda são, exceto:
- a) espessamento parietal segmentar do cólon (aumento da camada muscular).
 - b) imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior na parede da alça
 - c) aumento da ecogenicidade da gordura mesentérica adjacente.
 - d) Doppler colorido com redução da vascularização parietal
 - e) coleções peri-colônicas nos casos de perfuração diverticular

Respostas

- 1) Alternativa: A
- 2) Alternativa: B
- 3) Alternativa: D
- 4) Alternativa: C
- 5) Alternativa: D