

# Retroperitônio, Grandes Vasos e Adrenais

## CBR Responde

- 1) O retroperitônio está situado entre:
  - a) A fáscia de Gerota e a fáscia de Zucherkandl
  - b) Os folhetos da fáscia lateroconal
  - c) O peritônio parietal posterior e a fáscia transversal
  - d) Os pilares diafragmáticos
  - e) Os pilares diafragmáticos e o espaço de Retzius
  
- 2) Sobre o retroperitônio qual a alternativa correta?
  - a) Todos os compartimentos retroperitoneais contem órgãos sólidos
  - b) Não há comunicação entre o retroperitônio e o peritônio
  - c) A aorta e a veia cava superior situam-se no espaço perirrenal
  - d) O maior espaço retroperitoneal contém os músculos psoas e quadrado lombar
  - e) Partes do duodeno, do cólon ascendente e do cólon descendente situam-se no retroperitônio
  
- 3) Sobre tumores do retroperitônio, qual a alternativa correta?
  - a) O linfoma Hodking é o tumor maligno mais prevalente no retroperitônio, apesar de não ser primário
  - b) O lipossarcoma apesar de conter gordura raramente é hiperecoico
  - c) Sempre é possível diferenciar linfonodos linfomatosos de metastáticos
  - d) A maioria dos tumores primários do retroperitônio é benigna
  - e) São exemplos de neoplasias primárias malignas do retroperitônio: lipossarcoma, leiomiossarcoma e histiocitoma fibroso
  
- 4) Quais os ramos da aorta abdominal que são usualmente visíveis na ultrassonografia?
  - a) Artérias renais principais, artéria mesentérica superior e artéria esplênica
  - b) Artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior e artéria esplênica
  - c) Artéria hepática comum, artéria mesentérica inferior, tronco celíaco
  - d) Tronco celíaco, artéria mesentérica superior e artérias renais principais
  - e) Artérias renais principais, artérias suprarrenais e artéria gastroduodenal

## Retroperitônio, Grandes Vasos e Adrenais

- 5) Sobre as adrenais, qual a alternativa correta?
- a) Feocromocitoma é um tumor benigno usualmente hiperfuncionante
  - b) Adenoma é o tumor benigno mais comum das adrenais e caracteriza-se sempre por imagem marcadamente hiperecoica.
  - c) O incidentaloma adrenal mais comum é a metástase
  - d) O aspecto ultrassonográfico do mielolipoma é hipoecoico
  - e) O cisto de adrenal sempre é anecoico homogêneo.

### Respostas

- 1) Alternativa: C
- 2) Alternativa: E
- 3) Alternativa: E
- 4) Alternativa: D
- 5) Alternativa: A