

# Avaliação Ultrassonográfica das Glândulas Paratireoides

## CBR Responde

- 1) Um ultrassonografista realiza exame cervical em um paciente de 16 anos de idade. No decorrer do exame ele encontra 3 linfonodos adjacentes, ovalados, com maior diâmetro inferior a 1,5 cm e com presença de hilo. Assinale a
  - a) Pode-se dizer que é uma linfonodomegalia
  - b) Na ausência de queixa clínica, o achado é normal.
  - c) O achado de linfonodos “em cacho de uva” é sempre sinal de inflamação.
  - d) O exame é considerado normal se estes linfonodos estão no nível VI.
  - e) Há necessidade de fazer PAAF nestes linfonodos.
  
- 2) Linfonodos hiperecogênicos podem estar relacionados às patologias abaixo, exceto:
  - a) Metástase de carcinoma de células escamosas
  - b) Metástase de carcinoma papilífero
  - c) Metástase de carcinoma medular
  - d) Metástase de carcinoma anaplásico
  - e) Variante esclerosante do carcinoma papilífero
  
- 3) Um paciente apresenta ao ultrassom linfonodos com macrocalcificações. Dentre as alternativas abaixo, assinale a alternativa correta:
  - a) A principal suspeita é de metástase de carcinoma papilífero
  - b) As macrocalcificações são indicativas de processo inflamatório agudo
  - c) O achado pode indicar acometimento ganglionar por tuberculose
  - d) A principal suspeita é a Doença de Lyme
  - e) Estes achados podem ser normais em alguns níveis cervicais
  
- 4) Em relação ao Doppler dos linfonodos, assinale a alternativa correta:
  - a) Os linfonodos benignos apresentam altos índices de resistividade
  - b) Vascularização hilar é comum nos linfonodos malignos
  - c) Vascularização apenas periférica é comum em linfonodos reacionais
  - d) Ramos vasculares que saem do vaso hilar é achado comum em linfonodos normais e inflamatórios
  - e) Linfonodos metastáticos em geral são pouco vascularizados.

## Avaliação Ultrassonográfica das Glândulas Paratireoides

- 5) Em relação ao nível cervical I, assinale a alternativa correta:
- a) Seu limite superior é o osso hioide
  - b) O nível IB localiza-se entre os ventres anteriores dos músculos digástricos
  - c) O nível IB é medial ao nível IA
  - d) Pequenos linfonodos arredondados podem ser normais no nível IA
  - e) A glândula parótida encontra-se no nível IB

### Respostas

- 1) Alternativa: B
- 2) Alternativa: D
- 3) Alternativa: C
- 4) Alternativa: D
- 5) Alternativa: D