

CAPÍTULO 13

TUBERCULOSE

Felipe Krakauer | Nara Vasconcelos Cavalcanti

RESPOSTAS

1. Interpretação do caso de acordo com escore:

- Paciente apresenta febre há mais de 2 semanas – 15 pontos.
- Apresenta infiltrado bilateral com mais de 2 semanas – 15 pontos.
- Parente próximo com alta probabilidade de tuberculose – 10 pontos.

PPD entre 5 e 9 mm – 5 pontos.

$15 + 15 + 10 + 5 = 45$, ou seja, alta probabilidade de tuberculose.

2. A conduta deve ser tratar A. por TB pulmonar com o esquema RIP por 2 meses e RI por mais 4 meses, mesmo com a bacterioscopia negativa, por conta da alta probabilidade vista pelo sistema de pontuação.
3. Sobre os cuidados com RN, deve-se avaliar a possibilidade de tuberculose congênita e, caso negativa, iniciar quimioprofilaxia conforme Fluxograma a seguir. Não se deve vacinar o RN. Após 3 meses da quimioprofilaxia, deve-se fazer PT e seguir com vacinação com BCG caso negativo, ou, caso positivo, manter o tratamento por mais 3 meses de isoniazida ou 1 mês de rifampicina.