

# CAPÍTULO 20

## Infecções do trato urinário

Clara Paoleschi Carvalho de Lima | Luciana dos Santos Henriques Sakita

### RESPOSTAS

1. A melhor forma de realizar a coleta do exame de urina, considerando o paciente um lactente de 8 meses, é por meio da sondagem vesical ou punção suprapúbica (alternativa C). A coleta por saco coletor pode ser usada como uma triagem inicial, no entanto, não é a melhor forma de coleta, pois ter maior risco de contaminação externa.
2.
  - Fimose.
  - Febre de 39°C.
  - Raça não negra.
  - Febre > 24 h.
3.
  - a. Existe indicação para iniciar antibioticoterapia empírica? Sim, devido aos fatores de risco presentes no caso – febre de 39°C por mais de 24 h e fimose.
  - b. Qual seria a primeira linha de antibioticoterapia, considerando idade e quadro clínico do paciente? Cefuroxima – 20 a 40mg/kg/dia, dividido em duas doses.
4. De acordo com a academia americana de pediatria, um ultrassom de rins e vias urinárias deve ser solicitado após um episódio de infecção do trato urinário em um lactente de 8 meses (alternativa D). Essa indicação ocorre principalmente para detectar se há alguma anomalia estrutural. Se este vier com alguma alteração, deve-se prosseguir para os exames mais específicos, como a uretrocistografia miccional.