

Doenças Inflamatórias e Infecciosas da Mama

CBR Responde I

- 1) Paciente com quadro clínico de mastite puerperal não complicada sem resposta ao tratamento clínico há 3 semanas para a qual foi indicada biópsia por agulha grossa da área. Quais riscos devem ser comunicados ao paciente relacionados ao procedimento?
 - a) Sangramento importante.
 - b) Desenvolvimento de fístula láctea.
 - c) Agravamento dos sinais inflamatórios / infecciosos relacionados à evolução do quadro ou entrada de novos patógenos.
 - d) Todas as alternativas acima.

- 2) Sobre a mastite puerperal, assinale a alternativa incorreta:
 - a) Na ausência de resposta ao tratamento clínico ou surgimento de massa palpável, a ultrassonografia costuma ser o primeiro exame para pesquisa de complicações.
 - b) Carcinoma inflamatório é um diagnóstico diferencial possível e deve ser suspeito quando não há resposta clínica ao tratamento e em mulheres com risco aumentado para desenvolvimento de câncer de mama.
 - c) Se a mulher tem menos de 30 anos, carcinoma mamário não é uma hipótese a ser considerada entre os diferenciais.
 - d) Quando complicada com abscesso, a punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia é uma opção para alívio dos sintomas e auxílio no tratamento.

- 3) São fatores de risco para desenvolvimento de infecção de sítio cirúrgico, exceto:
 - a) Diabetes mellitus.
 - b) Obesidade.
 - c) Tabagismo.
 - d) Idade inferior a 40 anos.

- 4) Sobre a mastite tuberculosa, é correto afirmar:
 - a) Sempre ocorre em associação com tuberculose pulmonar.
 - b) É mais frequente em adolescentes.
 - c) Pode assumir apresentação clínica nodular, difusa ou esclerosante.
 - d) Os achados de imagem são patognomônicos e suficientes para instituir o tratamento.

Doenças Inflamatórias e Infecciosas da Mama

- 5) Sobre a mastite neonatal, é possível afirmar:
- a) Mais frequente em crianças do sexo masculino, filhos de mães diabéticas.
 - b) A ultrassonografia é útil para diferenciar infecções restritas à pele e para pesquisa de complicações, tais como abscessos.
 - c) Não faz diagnóstico diferencial com ginecomastia neonatal transitória.
 - d) É fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama.

Respostas

- 1) Alternativa: D
- 2) Alternativa: C
- 3) Alternativa: D
- 4) Alternativa: C
- 5) Alternativa: B