

# Estudo por Imagem dos Nódulos e Cistos Mamários

**Tabela 6.2 – Diagnóstico diferencial - Descritores ACR BI-RADS®**

FORMA		
Redonda ou Oval		DENSIDADE Conteúdo Adiposo
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cistos</li> <li>■ Fibroadenoma</li> <li>■ Seroma</li> <li>■ Hematoma</li> <li>■ Necrose gordurosa/cisto oleoso</li> <li>■ Linfonodo intramamário</li> <li>■ Lipoma</li> <li>■ Galactocele</li> <li>■ Hamartoma</li> <li>■ Papiloma</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tumor fibroepitelial</li> <li>■ Tumor Filóide</li> <li>■ Carcinoma ductal não-especial, de alto grau</li> <li>■ Carcinoma mucinoso</li> <li>■ Carcinoma papilar</li> <li>■ Hiperplasia estromal pseudoangiomatosa (PASH)</li> <li>■ Adenose esclerosante</li> <li>■ Metástases</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Linfonodo intramamário</li> <li>■ Seroma/hematoma pós-op com gordura de permeio</li> <li>■ Lipoma</li> <li>■ Galactocele</li> <li>■ Hamartoma</li> <li>■ Necrose gordurosa/Cisto oleoso</li> </ul>
MARGEM		
Circunscrita	Microlobulada	Espiculada
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cistos</li> <li>■ Seroma</li> <li>■ Hematoma</li> <li>■ Cisto oleoso</li> <li>■ Linfonodo intramamário</li> <li>■ Lipoma</li> <li>■ Galactocele</li> <li>■ Hamartoma</li> <li>■ Fibroadenoma</li> <li>■ Adenoma tubular</li> <li>■ Tumor Filóide</li> <li>■ Papiloma</li> <li>■ Carcinoma papilar</li> <li>■ Carcinoma invasivo não-especial, de alto grau</li> <li>■ Carcinoma metaplásico</li> <li>■ Carcinoma mucinoso</li> <li>■ Metástases</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Carcinoma Invasivo não-especial</li> <li>■ Carcinoma mucinoso</li> <li>■ Microcistos agrupados</li> <li>■ Fibroadenoma</li> <li>■ Fibrose focal</li> <li>■ Adenose esclerosante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Carcinoma Invasivo não-especial</li> <li>■ Carcinoma lobular invasivo, variante sólida*</li> <li>■ Cicatrizes pós-operatórias</li> <li>■ Adenose esclerosante</li> <li>■ Cicatriz radial/lesão esclerosante complexa**</li> <li>■ Tumor de células granulares</li> <li>■ Fibromatose (tumor desmóide)</li> </ul>
	Indistinta	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Carcinoma invasivo não-especial</li> <li>■ Hematoma</li> <li>■ Abscesso</li> <li>■ Cisto com processo inflamatório periférico</li> <li>■ Metástases</li> </ul>	

\* Em geral é distorção arquitetural focal sem massa, mas pode ser nódulo espiculado;

\*\*10 a 30% dos casos de cicatriz radial estão associados à hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal in situ, neoplasia lobular ou carcinoma tubular.

Fonte: Adaptada de Urban LABD, Chala LF, Mello GGE de. Série CBR - Mama. 1 st ed. Rio de Janeiro, 2019; Georgian-Smith D, Lawton T. Imagens da mama e Correlações Patológicas - Uma Abordagem Baseada em Padrões. 1st ed. Brasil: DiLivros, 2017.