

## Faringe e Esôfago Cervical

<b>T0</b>	Nenhuma tumor primário identificado
<b>T1</b>	Tumor ≤ 2 cm na maior dimensão
<b>T2</b>	Tumor > 2 cm, mas ≤ 4 cm
<b>T3</b>	Tumor > 4 cm ou invadindo a superfície lingual da epiglote
<b>T4</b>	Tumor invadindo a laringe, músculos extrínsecos da língua, pterigoideo medial, palato duro, mandíbula ou além

Critério clínico	
<b>Nx</b>	Linfonodos regionais não podem ser avaliados
<b>cN0</b>	Sem metástase linfonodal regional
<b>cN1</b>	Um ou mais linfonodos ipsilaterais, todos ≤6 cm
<b>cN2</b>	Linfonodos contralaterais ou bilaterais, todos ≤6 cm
<b>cN3</b>	Linfonodo(s) >6 cm
Critério patológico	
<b>Nx</b>	Linfonodos regionais não podem ser avaliados
<b>pN0</b>	Sem metástase linfonodal regional
<b>pN1</b>	Metástase em ≤4 linfonodos
<b>pN2</b>	Metástase em >4 linfonodos

### Estadiamento TNM do câncer orofaríngeo - associado ao HPV

<b>cM0</b>	Nenhuma evidência de metástases
<b>cM1</b>	Metástase à distância
<b>pM1</b>	Metástase à distância, confirmada microscopicamente

Estádio	Tumor (máxima penetração)	Metástase linfonodal regional	Metástase a distância
<b>Clinico</b>			
I	T0-2	cN0-1	M0
II	T0-2	cN2	M0
	T3	cN0-2	M0
III	T0-4	cN3	M0
	T4	cN0-3	M0
IV	Qualquer T	Qualquer cN	M1
<b>Patológico</b>			
I	T0-2	pN0-1	M0
II	T0-2	pN2	M0
	T3-4	pN0-1	M0
III	T3-4	pN2	M0
IV	Qualquer T	Qualquer pN	M1