

Faringe e Esôfago Cervical

Tx	Tumor primário não pode ser avaliado
T0	Nenhuma evidência de tumor primário, mas envolvimento nodal positivo para EBV
Tis	Carcinoma <i>in situ</i>
T1	Tumor restrito à nasofaringe ou estende-se à orofaringe e/ou cavidade nasal sem envolvimento parafaríngeo
T2	Tumor se estende ao espaço parafaríngeo e/ou aos tecidos moles adjacentes (músculos pterigóideo medial, pterigóideo lateral ou pré-vertebrais)
T3	Tumor infiltra estruturas ósseas na base do crânio, vértebras cervicais, pterigóides e/ou seios paranasais
T4	Tumor com extensão intracraniana ou envolvimento de nervos cranianos, hipofaringe, órbita, parótida e/ou infiltração extensiva de tecidos moles

Nx	Linfonodos não podem ser avaliados
N0	Sem metástase linfonodal regional
N1	Linfonodos cervicais unilaterais e/ou Retrofaríngeos unilaterais ou bilaterais ≤ 6 cm
N2	Linfonodos cervicais bilaterais ≤ 6 cm
N3	Linfonodo unilateral ou bilateral > 6 cm e/ou Metástase linfonodal que se estende abaixo da borda caudal da cartilagem cricóide

cM0	Nenhuma evidência de metástases
cM1	Metástase à distância
pM2	Metástase à distância, confirmada microscopicamente

Estadiamento TNM do câncer nasofaríngeo

Estágio	Tumor (máxima penetração)	Metástase linfonodal regional	Metástase a distância
0	Tis	N0	M0
I	T1	N0	M0
II	T1	N1	M0
	T2	N0, N1	M0
III	T1, T2	N2	M0
	T3	N0-2	M0
IVA	T4	N0-2	M0
	Qualquer T	N3	M0
IVB	Qualquer T	Qualquer N	M1